

Prueba de Papanicolaou anormal:

Lo que debería saber

La prueba de Papanicolaou puede salvar vidas.

La prueba de Papanicolaou busca cambios en las células del cuello uterino (la abertura del útero). Estos cambios podrían conducir al cáncer. Cuando se encuentran cambios anormales, se necesita tratamiento antes de que se desarrolle el cáncer. Cuanto antes reciba tratamiento la persona, mejor!

Cuando una persona de Papanicolaou es anormal, que significa eso?

Si una prueba de Papanicolaou es anormal, por lo general no significa que haya cáncer de cuello uterino. La mayoría de las veces, una prueba de Papanicolaou anormal significa:

- Hay células anormales que podrían convertirse en cáncer si no se tratan.

Y/O

- Puede haber una infección por el virus del papiloma humano (VPH de alto riesgo)

Qué pasa si hay cambios celulares anormales?

La mayoría de las veces, los cambios en las células desaparecerán por sí solos. Es posible que su proveedor quiera que regrese para hacerse una prueba de Papanicolaou en 12 meses.

O es posible que le pidan que se haga un examen especial del cuello uterino llamado colposcopia.



Cuida bien tu salud, para ti,
y para aquellos que te
importan.



Family PACT

(916) 650-0414 | FamilyPACT@dhcs.ca.gov

¿Qué sucede durante una colposcopia?

Esta Mirada cuidadosa a su cuello uterino no duele y puede ser todo lo que se necesita.

- Durante este examen, el proveedor usará una luz brillante y una lupa para examinar su cuello uterino.



Mi proveedora me explicó el examen.

El proveedor también puede necesitar hacer una biopsia al mismo tiempo.

- Se toma una pequeña porción de tejido cervical y se envía a un laboratorio.
- Durante la biopsia, es posible que sienta un pequeño pellizco o calambres leves.

Qué sucede después de estos exámenes?

Algunas personas no necesitarán ningún tratamiento en absoluto y solo tendrá exámenes de seguimiento. Otras personas necesitarán un tratamiento en el consultorio para eliminar las células anormales.

Su proveedor hablará con usted sobre qué tratamiento puede necesitar. El tratamiento dependerá del tipo y ubicación de las células anormales.

Obtenga la atención que necesita. No espere!

Lo importante es recibir el tratamiento que necesita cuando su proveedor lo recomiende.

- Hable con su proveedor sobre cualquier cosa que no entienda o que le preocupe.
- Siga haciendo preguntas hasta que obtenga respuestas que comprenda.
- Obtenga las pruebas y exámenes que necesita. No los pospongas!

Protege del cáncer de cuello uterino!

- Hágase una prueba de VPH de alto riesgo con la frecuencia recomendada por su proveedor.
- Obtenga la atención de seguimiento que necesita. No espere.
- Si tiene menos de 46 años, pregunte sobre la vacuna contra el VPH.
- No fume cigarrillos. Fumar aumenta las posibilidades de desarrollar cáncer de cuello uterino.
- Usar condones cada vez que tenga relaciones sexuales. Puede reducir las posibilidades de que se infecte con otros tipos de VPH que pueden causar cáncer de cuello uterino.