

Prueba de Papanicolaou + VPH anormal: Lo que debería saber



Cuida bien tu salud, para ti,
y para aquellos que te
importan.



Family PACT

(916) 650-0414 | FamilyPACT@dhcs.ca.gov

La prueba de Papanicolaou +VPH puede salvar vidas.

La prueba de Papanicolaou + VPH (también llamada “prueba conjunta”) detecta la infección por el virus del papiloma humano (VPH de alto riesgo) y los cambios en las células del cuello uterino (la apertura del útero) en personas mayores de 30 años que podría provocar cáncer de cuello uterino. Cuando ciertos tipos de VPH de alto riesgo están presentes o cuando se encuentran cambios anormales, se necesita tratamiento antes de que se desarrolle el cáncer de cuello uterino. Entre mas temprano reciba tratamiento una persona, mejor!

Cuando una prueba de Papanicolaou + VPH es positiva, qué significa eso?

Si una prueba de Papanicolaou + VPH es positiva, generalmente no significa que haya cáncer de cuello uterino. Un resultado anormal de la prueba significa:

- Hay células anormales en el cuello uterino que pueden necesitar tratamiento.
Y/O
- Hay una infección con un tipo de VPH de alto riesgo. Los tipos de VPH 16 y 18 son los más propensos a causar células anormales en el cuello uterino.

Qué se debe hacer a continuación?

La mayoría de las veces, los cambios celulares menores o una infección por VPH desaparecerán por si solos. Es posible que su proveedor quiera que regrese para hacerse una prueba de Papanicolaou + VPH en 12 meses.

O es posible que le pidan que se haga un examen especial del cuello uterino llamado colposcopia.

Qué sucede durante una colposcopia?

Esta Mirada cuidadosa a su cuello uterino no duele y puede ser todo lo que se necesita.

- Durante este examen, el proveedor usará una luz brillante y una lupa para examinar su cuello uterino.



Mi proveedora me explicó el examen.

El proveedor también puede necesitar hacer una biopsia al mismo tiempo.

- Se toma una pequeña porción de tejido cervical y se envía a un laboratorio.
- Durante la biopsia, es posible que sienta un pequeño pellizco o calambres leves.

Qué sucede después de estos exámenes?

Algunas personas no necesitarán ningún tratamiento y solo tendrán exámenes de seguimiento. Otras personas necesitarán un tratamiento en el consultorio para eliminar las células anormales.

Su proveedor hablará con usted sobre qué tratamiento puede necesitar. El tratamiento dependerá del tipo de VPH de alto riesgo, las células anormales y el lugar donde se encuentran.

Obtenga la atención que necesita. No espere!

Lo importante es recibir el tratamiento que necesite cuando su proveedor lo recomiende.

- Hable con su proveedor sobre cualquier cosa que no entienda o que le preocupe.
- Siga haciendo preguntas hasta que obtenga respuestas que comprenda.
- Obtenga las pruebas y exámenes que necesite. No los posponga!

Protégete del cáncer de cuello uterino!

- Hágase una prueba de Papanicolaou + VPH con la frecuencia recomendada por su proveedor.
- Obtenga la atención de seguimiento que necesite. No espere!
- Si tiene menos de 46 años, pregunte sobre la vacuna contra el VPH.
- No fume cigarrillos. Fumar aumenta las posibilidades de desarrollar cáncer de cuello uterino.
- Usar condones cada vez que tenga relaciones sexuales. Puede reducir las posibilidades de que se infecte con otros tipos de VPH que pueden causar cáncer de cuello uterino.

