

Sobre la Inyección Anticonceptiva

Es importante recibir las inyecciones a tiempo. Debe recibir la próxima inyección en 12 semanas.

Debe recibir la próxima inyección anticonceptiva:

<i>Fecha de la aplicación</i>	<i>Fecha de la próxima inyección</i>	<i>Fecha límite</i>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Preste atención a los síntomas de advertencia.

Llame a su médico de Family PACT si presenta:

- Dolores de cabeza muy Fuertes y repetidos
- Sangrado vaginal excesivo
- Depresión
- Dolor intenso en la zona inferior del abdomen

Llame a su médico de inmediato si presenta alguno de estos síntomas o si piensa que puede estar embarazada.



Family PACT



Número de teléfono de su médico:

Posibles efectos secundarios:

- A todas las mujeres les cambia la regla. Por ejemplo, sangran cuando no tienen la regla o tienen reglas ligeras que duran más días. Con el tiempo, la regla puede desaparecer por completo.
- Algunas mujeres podrían presentar dolores de cabeza, cansancio, náuseas o sentir los senos más sensibles.
- Algunas pocas mujeres podrían sentirse deprimidas.
- Algunas mujeres podrían subir de peso al usar la inyección.
 - Lleve un registro de su aumento de peso.
 - Si aumenta más de 5 a 10 libras (de 2.3 kg a 4.5 kg) en los primeros 6 meses, hable con su médico de Family PACT.

Consejos para recordar:

Si no recibió la siguiente inyección anticonceptiva o si la recibió 3 o más semanas de retraso:

- Obtenga la inyección de inmediato.
- Use otro método, como condones. Continúe usándolos durante una semana después de recibir la inyección.
- Si recibió la inyección con retraso y tuvo relaciones sin protección, tome píldoras Anticonceptivas de Emergencia (AE) de inmediato.

La inyección anticonceptiva no la protege del VIH ni de otras infecciones de transmisión sexual (ITS) que las personas contraen al tener relaciones sexuales.

Use condones junto con la Inyección para protegerse de estas infecciones.